出血性腦中風

(1) 腦血管破裂產生血塊壓迫腦細胞組織及影響供血，雖然出血性腦中風在腦中風中佔較少比例，但死亡率卻明顯較高。（阻塞性腦中風比較多病例發生）。

(2) 出血性腦中風疾病成因多為長期高血壓與高血脂（膽固醇過高）導致動脈血管硬化，血管壁因此變得脆弱，一旦血壓突然升高，脆弱的血管壁即有破裂的可能。

(3) 腦中風會根據出血部位不同而有不同症狀。如大腦淺層出血會出現頭痛、半側下肢或上肢無力

(4) 大腦深層部位出血，大腦深層區域包括基底核、視丘。這些構造是有重要的生理功能，如記憶功能，病人會出現短期(近期)記憶嚴重下降的狀況，引起失智。

(5) 同時此地區也是神經傳遞訊息必經之路。如發生出血時，病人會產生

病人會產生半側無力、半側麻木或對側視野半盲。噁心，嘔吐極為常見。有時會因腫塊效應，而有同側瞳孔擴大現象（瞳孔擴大看不見東西）。

(6) 出血性腦中風一旦血壓突然升高，血管破裂出血，並出現頭痛、臉部、手部、腳部麻木無力，尤其以單側發生為主，之後會出現意識混亂，甚至失去平衡，暈眩或昏倒。

(7) 生活規律、散步、氣功，平安無事。降血脂、降血壓藥要按時服用。 (3)